



Fiche de culture : Les *Anguloa*

Facilité de culture : Facile

Distribution géographique : Colombie, Pérou, Bolivie et Venezuela.

Végétation : Orchidée terrestre dans les forêts claires, au milieu des broussailles, entre 1200 et 2300 m d'altitude.

Plante sympodiale qui peut perdre ses feuilles à l'arrivée des nouvelles pousses ou de la floraison. Les pseudo-bulbes produisent à leur base plusieurs inflorescences verticales uniflores. 9 espèces et 3 hybrides naturels.

Durée de floraison : 5 à 7 semaines en hiver ou au printemps.

Parfums : Oui pour certains.

Eclairage : Ils craignent le soleil à mi-journée pendant l'été préférant celui du matin ou du soir. En hiver, beaucoup de lumière est indispensable pour favoriser la naissance des inflorescences.

Températures : Culture en serre tempérée ou froide. 15 à 21° C le jour et 10 à 16° C la nuit (écart j/n d'au moins 8° C). Culture en appartement possible dans une pièce fraîche et lumineuse. De jour, en été, ils peuvent supporter des températures supérieures avec une forte humidité et une bonne ventilation. En hiver, lorsque les arrosages sont réduits, la température peut chuter à 4 ou 5° C la nuit.

Culture en extérieur possible, de juin à septembre, en les plaçant sous un arbre à l'Est ou à l'Ouest.

Hygrométrie : 50 à 60 %. Si supérieure, un bon brassage d'air est nécessaire pour éviter la formation de champignons sur les feuilles.

Arrosages : Eau non calcaire. Abondants et réguliers pendant la formation des pseudo-bulbes, en maintenant le substrat légèrement humide. Ensuite, espacer les arrosages en laissant le compost sécher entre les apports tout en évitant que les pseudo-bulbes se rident. Bien vaporiser l'envers des feuilles en cas de canicule afin de les protéger de la déshydratation et d'éviter l'attaque des araignées rouges.

Période de repos : Oui en espaçant les arrosages après que les pseudo-bulbes soient arrivés à maturité.

Rempotage : Tous les 2 ans lors de la reprise de la végétation.

Substrat : 60 % d'écorce de pin fine ou moyenne, 20 % de sphaigne et 10 % de billes d'argile expansée.

Apports d'engrais : Au démarrage des nouvelles pousses, apport d'engrais azoté pendant 3 mois, puis d'un engrais riche en potasse et phosphore pour favoriser la floraison de la plante. Pas d'engrais pendant la période de repos.

Remarque : Les Anglo-saxons l'ont appelée « Orchidée tulipe ». Bien plus poétique, cette orchidée, dans ses pays d'origine, est appelée « Berceau de Vénus »